Gli errori e i punti di forza dell'ecocardiografia nell'ipertensione polmonare

Andrea Sonaglioni

Unità Operativa di Cardiologia, Ospedale San Giuseppe MultiMedica, Milano

Calcolo della PAPs: stima della TRV (m/sec)

- La **TRV** dipende dal **gradiente pressorio sistolico retrogrado (ΔP)** tra ventricolo destro ed atrio destro
- **ΔP (PSVdx-PAD) = 4 x (TRV)²**, equazione di Bernoulli modificata
- **PSVdx (PAPs) = 4 x (TRV)² + PAD**

Stima della TRV

- La **velocità di picco del rigurgito tricuspideale (TRV)** è un parametro che permette di stimare il gradiente pressorio retrogrado tra ventricolo destro ed atrio destro durante la sistole.
- La stima della velocità del flusso di rigurgito tricuspideale viene effettuata fundamentalmente dall'**approccio apicale (sezione 4C)**, ma ne è possibile una stima approssimativa anche dagli **approcci parasternale asse corto**, da un **approccio 4C parasternale off axis** e dall'**approccio 4C sottocostale**.
- **Doppler a onda continua e colorDoppler.**

Doppler ad onda continua

- Il **fascio ultrasonoro (US)** deve essere diretto verso la valvola tricuspide ed **allineato parallelamente al jet** ad elevata velocità tra ventricolo destro ed atrio destro.
- Mantenere un angolo inferiore a 20° tra il fascio Doppler e la direzione del jet rigurgitante: **il segnale Doppler è angolo-dipendente** ed è tanto più intenso quanto più l'incidenza del fascio US è parallela al jet di rigurgito tricuspideale in esame.
- Pertanto, la TRV dovrebbe essere **presa da multiple proiezioni ed off-axis se necessario**, ricercando l'envelope migliore e misurando la massima velocità.

Color Doppler

- L'uso del colorDoppler è raccomandato per ottenere **il migliore allineamento tra il fascio US e il flusso rigurgitante.**
- Con l'ausilio del colorDoppler possiamo identificare la direzione del jet rigurgitante e scegliere **la finestra ecocardiografica più consona ad un corretto allineamento.**
- Il colorDoppler consente anche di stimare la **gravità del rigurgito.**

Stima della TRV: sezione 4C apicale

Stima della TRV: sezione 4C parasternale off axis

Calcolo della PAPs: stima della PAD

VCI	Collasso inspir.	PAD
<18 mm	>50%	5 mmHg
>18 mm	>50%	10 mmHg
>18 mm	<50%	15 mmHg
>18 mm	assente	20 mmHg

Cosa ci dicono le ultime linee guida

- “However, given the inaccuracies of RAP estimation and the amplification of measurement errors by using derived variables, we recommend using **the continuous wave Doppler measurement of peak TRV** (and not the estimated SPAP) as the main variable for assigning the echocardiographic probability of PH”.

Echocardiographic probability of pulmonary hypertension in symptomatic patients with a suspicion of pulmonary hypertension

Peak tricuspid regurgitation velocity (m/s)	Presence of other echo 'PH signs' ^a	Echocardiographic probability of pulmonary hypertension
≤2.8 or not measurable	No	Low
≤2.8 or not measurable	Yes	Intermediate
2.9–3.4	No	
2.9–3.4	Yes	High
>3.4	Not required	

Echocardiographic signs suggesting pulmonary hypertension, in addition to TRV measurement

A: The ventricles ^a	B: Pulmonary artery ^a	C: Inferior vena cava and right atrium ^a
Right ventricle/ left ventricle basal diameter ratio >1.0	Right ventricular outflow Doppler acceleration time <105 msec and/or midsystolic notching	Inferior cava diameter >21 mm with decreased inspiratory collapse (<50 % with a sniff or <20 % with quiet inspiration)
Flattening of the interventricular septum (left ventricular eccentricity index >1.1 in systole and/or diastole)	Early diastolic pulmonary regurgitation velocity >2.2 m/sec	Right atrial area (end-systole) >18 cm ²
	PA diameter >25 mm.	

PUNTI DI FORZA DELL'ECOCARDIOGRAMMA

- Metodica **non invasiva**, innocua, non utilizza emissioni di raggi X o sostanze radioattive.
- E' **ripetibile**.
- L'**attrezzatura** utilizzata per l'esame è **mobile**, facilmente trasportabile.
- Fornisce informazioni sull'**anatomia e la funzionalità del cuore**.
- Può essere utilizzato come strumento di **screening**.
- Può essere eseguito **sia a riposo che da sforzo fisico**.

Parametri ecocardiografici convenzionali

M-mode and 2D parameters	LV systolic function	LV diastolic function	RV systolic function	Pulmonary hemodynamics
LVEDDi, LVESDi, IVS, PWT by 2D-guided M-mode	LVEF (%), by the modified biplane Simpson's method	E/A ratio by transmitral PW-Doppler technique	TAPSE (mm), by M-mode	SPAP (mmHg) = $4 \times TRV^2 + RAP$
RWT = $(2 \times PWT)/LVEDD$	SV (ml) = $VTI_{lvot} \times CSA_{lvot}$	E/average e' ratio by PW-TDI	Tricuspid S'-wave velocity by TDI (cm/sec)	RAP (mmHg) = IVC size and collapsibility
LVEDVi, LVESVi by the modified biplane Simpson's method	CI (l/min/m ²) = $SV \times HR/BSA$	PCWP (mmHg) = $1.9 + 1.24 \times E/\text{average } e'$	Tei Index = $(IVRT + IVCT)/ET$	MPAP (mmHg) = $79 - 0.45 \times AT_{lvot}$
LAVi by the monoplane Simpson's method				PVR (dynes-sec/cm ⁵) = $80 \times [(TRV_{max} \times 10)/TVI_{lvot}] + 0.16$
RVIT by Echo 2D using the 4-chamber view				

Parametri ecocardiografici non convenzionali

Ecocardiografia nella diagnosi di ipertensione polmonare

- Sensibilità 85%
- Specificità 55%
- VPP 52%
- VPN 87%
- Accuratezza 48%

Sottostima ecocardiografica della PAPs

- Specie in pazienti con enfisema.
- Non corretto allineamento del fascio ultrasonoro.
- Traccia del jet di rigurgito tricuspидale non completa.
- Insufficienza tricuspидale severa e pressione atriale destra molto elevata (la presenza di un grosso orifizio rigurgitante determina dal punto di vista emodinamico un certo annullamento del gradiente tra Vdx e atrio dx, trasformando il sistema in una camera unica).
- Disfunzione ventricolare destra.

SOTTOSTIMA della TRV (1)

Segnale CW-Doppler del flusso di rigurgito tricuspидale proto-sistolico **evanescente o incompleto** (specie in pazienti con enfisema) con possibile lettura erronea della TRV e conseguente sottostima della PAPs

SOTTOSTIMA della TRV (2)

- **IT severa e PAD molto elevata** (la presenza di un grosso orifizio tricuspidalico rigurgitante determina dal punto di vista emodinamico un certo annullamento del gradiente tra Vdx e atrio dx, trasformando il sistema in una camera unica)

Attività cardiaca aritmica: SOVRASTIMA della TRV (1)

In presenza di **alti valori di TRV**, tendenza alla sovrastima del valore preciso di TRV, specie in presenza di aritmie quali la FA, specie se rapida, con conseguente potenziale elevazione al quadrato di eventuali letture erranee

Battito post-extrasistolico: SOVRASTIMA della TRV (3)

Guadagno CW-Doppler inadeguato con “frangiature”: sovrastima della TRV (2)

SOVRASTIMA della PAPs

Tendenza alla **sovrastima ecocardiografica della PAD**

Ecocardiio vs cateterismo cardiaco destro

CONCLUSIONI

- L'ecocardiogramma nella maggior parte dei casi **identifica correttamente l'ipertensione polmonare**, può essere usato come **esame di screening** e può contribuire a chiarire i **meccanismi patogenetici dell'ipertensione polmonare** in numerose patologie polmonari, comprese le malattie polmonari rare, consentendo lo **studio dinamico non solo della PAPs ma anche della morfologia e funzione di tutte le camere cardiache, sia a riposo che da sforzo fisico.**
- I **limiti dell'ecocardiogramma** sono legati a **ragioni di natura tecnico-procedurale**, ascrivibili alla lettura erronea di un jet di rigurgito tricuspideale, in difetto quando evanescente o incompleto, in eccesso quando molto denso e/o alla tendenza alla sovrastima ecocardiografica della pressione atriale destra.